

Tratamiento con metadona disminuye muertes de drogadictos



La Habana, 20 junio (RHC)- La mortalidad de las personas dependientes de opiáceos que siguen un tratamiento con metadona es tres veces menor que cuando lo abandonan, aseguró un estudio publicado hoy en la revista *British Medical Journal*.

Este tratamiento, aunque polémico, salva vidas y reduce significativamente los decesos, manifestó uno de los autores de la investigación, el doctor español Luis Sordo.

La adicción a los opiáceos es una enfermedad crónica, que causa 69 000 fallecimientos al año y como tal requiere tratamiento a muy largo plazo, sentenció.

'La metadona se suministra, bajo control sanitario, solo una vez al día y permite al individuo realizar otras actividades al mismo tiempo', explicó el investigador.

En su trabajo, pesquisó 122 885 personas tratadas con dicho fármaco entre uno y trece años y 15 831 tratadas con buprenorfina (medicamento alternativo) entre uno y cuatro años.

La Organización Mundial de la Salud estima que hay 15 millones de personas en el mundo dependientes de los opioides, entre ellos heroína, morfina o tramadol, de las cuales solo el 10% recibe tratamiento.

Desde su introducción en los años 60, la metadona ha sido el opiáceo más utilizado en tratamientos de sustitución para tratar a adictos a la heroína en programas de desintoxicación en casi todos los países del mundo.

(PL)

<https://www.radiohc.cu/noticias/salud/133252-tratamiento-con-metadona-disminuye-muertes-de-drogadictos>



Radio Habana Cuba